



ที่ นม ๐๐๒๓.๖/ว ๑๐๗๑

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทย
แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเรื่อง โรคไทรโนเป็นหนึ่งโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดิน
หายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่า
แนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรค
ไทรโน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรโนได้ในอนาคต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของ
ของไทรโน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ห้ายหนังสือ
ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratlga.go.th สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

๐๔๔-๒๔๔-๕๒๐

๒๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ ๒๔๕๒๓
วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๖๓๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคโอมิครอนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคโอมิครอนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคโอมิครอนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโอมิครอน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาด โรคโอมิครอนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคโอมิครอน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโอมิครอน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขที่ ๔๘๙๘๕

วันที่ 22 ต.ค. 2567

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐-๒๒๒๓-๕๒๕๕...

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๕๕๒

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน)

เลขที่ ๒๙๖

วันที่ 24 ต.ค. 2567

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา ๒.๒๔

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไทรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรนได้ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเน้นย้ำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายราชันย์ ชื่นหัว)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพด.สนผ.สป.

เลขรับที่ 1506

วันที่ 10 ต.ค. 67



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับ 4120
ปี 67

๒๗๔

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
สำนักนโยบายและแผน

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ)
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับ 8933
ปี 67

ด้วยโรคไกรณเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไกรณ ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยรายงานโรคไกรณเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไกรณไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไกรณ (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไกรณได้ในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=16134 หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๑๒/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖

สำเนาส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น





โรคไกรรณ

อันตรายถึงชีวิต



“โรคไกรรณ”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย
ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือการกตังแต่เดือนแรก

อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไกรรณ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง
ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ
ตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไกรรณในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน




ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น
เมื่ออายุ 4 ปี



การรักษา

- ✚ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- ✚ สวมหน้ากากอนามัย
- ✚ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ✚ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไกรรณมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ✚ หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค